



Protocol- wijzigingen

April 2023



Blaaskatheter spoelen

Bij het spoelen van de blaas met een steriele vloeistof, heeft een verpakking voor eenmalig gebruik de voorkeur.

Sonde door de buikwand met ballonfixatie

Houd 5 tot 10 mm speling aan tussen het externe fixatieplaatje en de huid bij sondes door de buikwand in plaats van de eerdergenoemde 2 mm (munddikte).

Douchen mag in de eerste dagen na een nieuw geplaatste sonde.



Dompelen en draaien van de sonde door de buikwand

Een PEG-J Sonde en een PEG sonde met interne fixatiedisk mag je wel dompelen maar absoluut **niet** draaien.

Wat zijn de richtlijnen m.b.t. dompelen en draaien ook alweer:

- PEG met interne fixatiedisk: wel dompelen, niet draaien.
- PEJ: wel dompelen, wel draaien.
- PEG-J: wel dompelen, niet draaien.
- Sonde met fixatieballon, PRG-sonde: dompelen volgens afspraak, wel draaien.
- Button: draaien volgens afspraak.

Wondverzorging

In alle wondzorg protocollen (rode, gele en zwarte wond) is het inspecteren van het wondverband op kleur, geur, hoeveelheid exsudaat en gebruik van het juiste absorberende materiaal toegevoegd.



Blaaskatheterisatie man (verblijfskatheter)

Als de arts opdracht heeft gegeven om de katheterballon met minder vloeistof te vullen dan de fabrikant adviseert: vul de ballon helemaal en zuig daarna wat niet nodig is terug.

