

Protocolwijzigingen

September 2023



1

Verzorgend wassen

Let op: niet alle merken wasdoekjes kunnen worden gebruikt om de ogen van een zorgvrager te wassen. Kijk of vraag dit na bij de leverancier.

2

Suprapubisch katheter verwisselen

- Desinfecteer de hals van de flacon ballonvulling met alcohol 70% voor je de spuit met ballonvulling klaarmaakt.
- Reinig de insteekplaats van de suprapubisch katheter eerst met gaasjes, gedrenkt in water, voordat je de katheter verwijdt.
- Desinfecteer de insteekplaats niet meer met alcohol 70%.

3

Injecteren

Wanneer je medicatie uit een glazen ampul of flacon met rubber aanprikpunt opzuigt, gebruik dan een opzuignaald met filter.

4

Toedienen van oogdruppels of oogzalf bij gebruik van contactlenzen

- Verwijder de contactlenzen vóór de toediening van oogdruppels of oogzalf. De lenzen verkleuren door het conserveermiddel in de oogdruppelvloeistof.
- Druppel, bij 1 of 2 maal daags, 's ochtends voor het indoen van de contactlenzen en 's avonds nadat de lenzen zijn uitgedaan.
- Wacht na het toedienen van de oogdruppel 15 à 30 minuten met het indoen van de lenzen. Dit geldt zowel voor harde als zachte lenzen.
- Draag geen contactlenzen gedurende 8 uur na het gebruik van oogzalf.



Noordhoff Zorg
Voor de professionals

5

Toedienen van oordruppels

Vraag de zorgvrager te gaan zitten of liggen met het hoofd iets opzij gebogen. Na het toedienen houdt de zorgvrager deze houding 3 tot 10 minuten aan.

Laat de zorgvrager gedurende deze tijd enige malen het oorklepje dichtdrukken en aan de oorschelp trekken, of help hierbij.

6

Tracheacanule (en uitzuigen)

- Het doorspoelen van de uitzuigkatheter met water na elke uitzuigsessie hoeft niet meer.
- Doorspoel de uitzuigkatheter met water na maximaal 3 keer uitzuigen en aan het eind van de handeling.
- Gebruik bij zichtbare verontreiniging in de uitzuigkatheter een nieuwe uitzuigkatheter.

7

Nefrostomiekatheter

Iedere zorgorganisatie kent zijn eigen voorschriften voor het omgaan met een nefrostomiekatheter. Stel jezelf hiervan op de hoogte.

TIP: meet de lengte van de katheter buiten het lichaam voor het verzorgen en markeer zo nodig met een watervaste stift. Noteer de lengte in het dossier.

8

Urine opvangen midstream

De schaamstreek hoeft niet meer gewassen te worden voor het opvangen van het urinemonster. Het is niet bewezen dat vooraf wassen een meerwaarde heeft vergeleken met niet vooraf wassen.

